

江苏大学
硕士研究生入学考试样题

科目代码： 308

A卷

科目名称 护理综合

满分：300分

注意：①认真阅读答题纸上的注意事项；②所有答案必须写在答题纸上，写在本试题纸或草稿纸上均无效；③本试题纸须随答题纸一起装入试题袋中交回！

一、最佳选择题（每题1.5分，共180分）

1. 整体护理的指导思想是（ ）
A. 以问题为本 B. 以人为本 C. 以护理对象的生理需要为本
D. 以护理对象的心理需要为本 E. 以护理对象的社会需要为本
2. 下列哪项不是罗伊适应模式的效应器（ ）
A. 生理功能 B. 自我概念 C. 角色功能 D. 互相依赖 E. 社会功能
3. 属于客观方面的健康资料是（ ）
A. 疼痛 B. 愉快 C. 水肿 D. 乏力 E. 不舒服
4. 以下哪种沟通技巧的运用可使对方有较多的控制权（ ）
A. 沉默 B. 核实所听内容 C. 开放式提问 D. 封闭式提问 E. 重复
5. 健康信念模式认为个体改变不良行为的关键在于（ ）
A. 健康信念的形成 B. 对行为效果的期望 C. 健康理论的理解
D. 对自我效能的认识 E. 对影响健康的因素的认知
6. 根据 Orem 自理模式的内容，属于健康不佳时的自理需求是（ ）
A. 摄入空气、水、食物 B. 维持独处和社会交往的平衡
C. 应对失去亲人的情况 D. 患病后做出相应的生活方式改变
E. 预防对健康有危害的因素
7. 关于文化休克，描述正确的是（ ）
A. 身体健康者应对能力弱 B. 儿童较成年人文化休克症状重
C. 生活阅历丰富者应对能力弱 D. 易适应者应对能力弱
E. 身体衰弱者应对能力弱
8. 根据弗洛伊德的观点，强迫性人格形成的心理发展障碍期是在（ ）
A. 口腔期 B. 肛门期 C. 性蕾期 D. 潜伏期 E. 生殖期
9. 男性，直肠癌 Miles 术后当日，进入 ICU，神志清醒，此时适用的护患关系模式为（ ）
A. 主动-被动型 B. 指导-合作型 C. 平等互动型
D. 共同参与型 E. 辅助教育型
10. 区分一个护理诊断与另一护理诊断主要根据（ ）
A. 名称 B. 定义 C. 相关因素 D. 诊断依据 E. 危险因素
11. 低蛋白饮食适用于下列哪类疾病的病人（ ）
A. 尿毒症 B. 肥胖症 C. 肺癌 D. 糖尿病 E. 慢性肝炎
12. 关于热疗减轻疼痛的机理，描述错误的是（ ）
A. 降低痛觉神经的兴奋性 B. 加速毒素废物的排出 C. 使肌肉、韧带组织松弛

- D. 降低毛细血管通透性 E. 消除水肿，解除对神经末梢的压力
13. 周女士，60岁，因心衰卧床已3周，体质消瘦，两下肢水肿，家庭病床护士巡视发现其骶尾部皮肤破溃，判定是炎性浸润期压疮。针对该病人压疮表现拟定护理计划，其中不妥的是（ ）
A. 每隔1-2个小时协助翻身 B. 在骶尾部垫气圈 C. 在无菌操作下抽出水泡内液体
D. 创面涂消毒液并用无菌敷料包扎 E. 平卧时在颈、腰处垫海绵垫
14. 关于浅昏迷的描述错误的是（ ）
A. 血压、脉搏、呼吸多无变化 B. 吞咽、咳嗽反射存在 C. 压迫眶神经有痛苦表情
D. 大声呼唤可睁眼，但不能回答 E. 大小便失禁或潴留
15. 患者女性，30岁，患急性肾炎，严重水肿，患者最适宜的饮食是（ ）
A. 高蛋白饮食 B. 低蛋白饮食 C. 低盐饮食 D. 无盐低钠饮食 E. 高热量饮食
16. 病人女性，32岁。妇科检查发现子宫后倾。产前检查，发现胎位不正，为纠正胎位，应采用（ ）
A. 截石位 B. 膝胸位 C. 头低足高位 D. 去枕仰卧位 E. 头高足低位
17. 少尿是指24小时尿量少于（ ）
A. 50ml B. 100ml C. 400ml D. 1000ml E. 1500ml
18. 病人女性，47岁，肝昏迷，为病人灌肠时禁用肥皂水，其原因是（ ）
A. 防止发生腹胀 B. 防止发生酸中毒 C. 防止对肠黏膜的刺激
D. 减少氨的产生及吸收 E. 以免引起顽固性腹泻
19. 用硫酸镁治疗惊厥的给药方式是（ ）
A. 口服 B. 外用 C. 含服 D. 肌肉注射 E. 湿敷
20. 输液时出现循环负荷过重反应的患者，吸氧时湿化瓶内应盛（ ）
A. 20%-30%乙醇 B. 1%-4%碳酸氢钠 C. 0.9%生理盐水
D. 冷开水 E. 2%-3%硼酸溶液
21. 测血压时，出现血压偏低的因素是（ ）
A. 袖带过窄 B. 袖带过松 C. 病人精神紧张
D. 血压计水银不足 E. 在寒冷环境中测量
22. 王女士，55岁，因多发性子宫肌瘤行全子宫切除术，术后第二天，护士协助病人采取半坐卧位，其最主要目的是（ ）
A. 减少局部出血 B. 减轻疼痛 C. 减轻心脏负担
D. 使渗出物流入盆腔 E. 有利于减轻呼吸困难
23. 对芽孢无效的化学消毒剂是（ ）
A. 环氧乙烷 B. 碘伏 C. 过氧乙酸 D. 甲醛 E. 戊二醛
24. 护士在为患者张某静脉注射25%葡萄糖溶液时，患者自述疼痛，推注时有阻力，推注部位局部隆起，抽无回血，此情况应考虑是（ ）
A. 针头滑出血管外 B. 针头部分阻塞 C. 针头斜面紧贴血管壁
D. 静脉痉挛 E. 针尖斜面一部分穿透下面血管壁
25. 脉搏短绌常见于（ ）
A. 窦性心动过缓 B. 心房颤动 C. 心室颤动
D. 房室传导阻滞 E. 阵发性心动过速
26. 张女士，40岁，患者主诉下腹部胀痛，排尿困难，体检见耻骨上膨隆，可扪及囊样包块，叩诊呈实音，有压痛。对该患者实施的护理措施中不正确的是（ ）

- A. 让患者听流水声 B. 口服利尿剂
 C. 用温水冲洗会阴部 D. 行导尿术 E. 膀胱区热敷
27. 臀大肌注射的连线定位法是()
 A. 骶脊和尾骨连线的外上 1/3 处 B. 骶脊和尾骨连线的中 1/3 处
 C. 骶前上棘和尾骨连线的外上 1/3 处 D. 骶前上棘和尾骨连线的中 1/3 处
 E. 骶前上棘和尾骨连线的下 1/3 处
28. 红细胞膜上含有A抗原者其血型为()
 A. A型 B. B型 C. A型或AB型 D. B型或AB型 E. O型
29. 患者男性, 46岁, 有糖尿病病史已16年, 最近一次发生酮症酸中毒, 经医院抢救, 病情才稳定。昨日因高热、咳嗽后, 突然感到极度口渴、厌食、恶心, 呼吸加速, 晚上四肢厥冷、脉细速、血压下降, 随即意识不清。此时应立即()
 A. 静脉注射50%葡萄糖 B. 静脉滴注等渗盐水 C. 静脉滴入正规胰岛素
 D. 静脉应用呼吸兴奋剂 E. 加大口服降糖药剂量
30. 禁忌冷疗的部位不包括()
 A. 心前区 B. 枕后、耳廓 C. 腹部 D. 腋窝 E. 脚底
31. 患者男, 23岁。脾外伤破裂引起出血约1000ml, 输大量库血后心率缓慢, 手足抽搐, 血压下降, 伤口渗血, 其原因是()
 A. 血钾升高 B. 血钙降低 C. 血钙升高 D. 血钾降低 E. 血钠降低
32. 双侧瞳孔扩大见于()
 A. 有机磷中毒 B. 颅内压增高 C. 吗啡中毒
 D. 脑疝早期征象 E. 高血压
33. 患者蔡某, 25岁, 因心情抑郁服下乐果, 在给其洗胃时首选的洗胃溶液是()
 A. 1:15000高锰酸钾 B. 生理盐水 C. 2%-4%碳酸氢钠
 D. 蛋清水 E. 温开水
34. 张某需输液体1800ml(点滴系数为15滴/毫升), 以每分钟60滴速度滴入, 输完液体需要的时间为()
 A. 6.5小时 B. 8.5小时 C. 7.5小时 D. 10.5小时 E. 12.5小时
35. 破伤风注射TAT的目的是()
 A. 杀死破伤风杆菌 B. 中和与神经结合的毒素 C. 中和破伤风毒素
 D. 清除毒素来源 E. 抑制破伤风杆菌生长
36. 下列哪一组传染病患者可以安置在同一病房()
 A. 流感、百日咳 B. 流脑、乙脑 C. 破伤风、炭疽
 D. 伤寒、痢疾 E. 甲型肝炎、斑疹伤寒
37. 面色苍白或灰暗、面容憔悴、目光暗淡、消瘦无力称为()
 A. 慢性病容 B. 危重病容 C. 满月病容 D. 二尖瓣病容 E. 急性病容
38. 给低钾患者补钾, 浓度不超过()
 A. 0.2% B. 0.3% C. 0.4% D. 0.5% E. 0.6%
39. 输血引起的溶血反应的最初具有代表性的症状是()
 A. 四肢麻木、腰背酸痛 B. 寒战、发热 C. 手足抽搐、心悸
 D. 尊麻疹、哮喘 E. 呼吸困难, 咳粉红色泡沫样痰
40. 患者男性, 40岁。晨起恶心、呕吐, 呕吐物呈咖啡色, 应判断为()
 A. 急性大出血 B. 幽门梗阻 C. 陈旧性出血 D. 食物中毒 E. 胆汁反流

41. 有一急性再生障碍性贫血患者，突然出现头痛、头晕、视物模糊、呼吸急促，你考虑该病人发生了什么情况？（ ）
A. 高血压危象 B. 脑动脉痉挛 C. 脑梗死 D. 颅内出血 E. 高血压脑病
42. 慢性肾衰竭病人，近日恶心、呕吐，进食少，并有尿少、脉缓，血清钾增高达 10.2mol/L 。估计病情继续恶化，可能会出现（ ）
A. 休克 B. 心力衰竭 C. 心脏骤停 D. 昏迷 E. 抽搐
43. 肺炎球菌肺炎的特征性表现是（ ）
A. 寒战高热 B. 铁锈色痰 C. 呼吸困难 D. 咳嗽 E. 胸痛
44. 李先生，60岁，因“脑血栓形成”后3周，右侧上下肢能在床面上平移，但不能抬起，判断其肌力为（ ）
A. 0级 B. 1级 C. 2级 D. 3级 E. 4级
45. 大量咯血是指咯血量（ ）
A. $>300\text{ml/d}$ B. $>400\text{ml/d}$ C. $>500\text{ml/d}$ D. $>600\text{ml/d}$ E. $>900\text{ml/d}$
46. 永久起搏器安装术后术侧上肢至少多长时间方可上抬（ ）
A. 2个月 B. 3个月 C. 4个月 D. 6个月 E. 9个月
47. ERCP中文指（ ）
A. 十二指肠造影 B. 胰管造影 C. 胆道造影 D. 胰胆管造影 E. 经皮肝穿刺
48. 肾病综合征病人24小时尿蛋白定量常为（ ）
A. $>2.5\text{ g/d}$ B. $>3.5\text{ g/d}$ C. $>150\text{ mg/d}$ D. $<1.5\text{ g/d}$ E. $>5.5\text{ g/d}$
49. 粒细胞缺乏症是指外周血中性粒细胞绝对值低于（ ）
A. $2.0 \times 10^9/\text{L}$ B. $1.5 \times 10^9/\text{L}$ C. $1.0 \times 10^9/\text{L}$ D. $0.5 \times 10^9/\text{L}$ E. $2.5 \times 10^9/\text{L}$
50. 关于癫痫持续状态的叙述，错误的是（ ）
A. 指一次癫痫发作持续30分钟以上 B. 连续多次发作癫痫
C. 发作间期意识恢复正常 D. 发作间期神经功能未恢复至正常
E. 发作间期意识模糊
51. 痛风最易累及的关节是（ ）
A. 膝关节 B. 肘关节 C. 第一跖趾关节 D. 踝关节 E. 指关节
52. 关于心脏支架植入术后抗凝治疗的护理，错误的是（ ）
A. 术后需终生抗凝治疗
B. 用药后需观察皮炎、出血或渗血、肠痉挛等症状
C. 如需拔牙或接受其他手术，应在手术前两天停药
D. 正确掌握抽血时间、凝血酶原时间及活动度
E. 预防跌倒等外伤
53. 患者女性，原有风湿性心脏病史，近来因呼吸困难明显入院。护士发现病人走动后即气喘，出汗，自诉心慌胸闷，但卧床休息时无此不适。根据该病人的心功能情况，你认为最恰当的休息与活动安排是（ ）
A. 绝对卧床，取半坐卧位 B. 卧床休息，限制走动 C. 需增加睡眠，户外活动
D. 可打太极拳，骑车等运动 E. 活动可不限，劳逸结合
54. 成人高血压的诊断标准是（ ）
A. 收缩压 $\geq 130\text{mmHg}$ 和（或）舒张压 $\geq 80\text{mmHg}$
B. 收缩压 $\geq 140\text{mmHg}$ 和（或）舒张压 $\geq 85\text{mmHg}$
C. 收缩压 $\geq 140\text{mmHg}$ 和（或）舒张压 $\geq 90\text{mmHg}$

D. 收缩压 $\geq 160\text{mmHg}$ 和 (或) 舒张压 $\geq 90\text{mmHg}$

E. 收缩压 $\geq 160\text{mmHg}$ 和 (或) 舒张压 $\geq 95\text{mmHg}$

55. 心源性水肿的特点是 ()

- A. 从身体下垂部位开始 B. 从身体疏松部位开始, 如眼睑
C. 久站者易有骶尾部、会阴部水肿 D. 易伴腹水 E. 易伴胸水

56. 肝性脑病最具有特征性的体征是 ()

- A. 腱反射亢进 B. 肌张力增加 C. 扑翼样震颤
D. 锥体束征阳性 E. 巴宾斯基征阳性

57. 赵先生, 29岁。因发热、右上腹疼痛、巩膜黄染、食欲减退伴恶心呕吐3日就诊,

初步诊断为病毒性肝炎, 收入传染病区。护士小张护理该病人后, 脱下的隔离衣应

()

- A. 挂在治疗室, 清洁面朝外 B. 挂在走廊, 清洁面朝外 C. 挂在走廊, 污染面朝外
D. 挂在值班室, 污染面朝外 E. 挂在更衣室, 清洁面朝外

58. 患者男性, 46岁, 肝硬化食管胃底静脉曲张破裂出血应用双气囊三腔管压迫止血48h, 出血停止, 此时对其双气囊三腔管应用护理正确方法的是 ()

- A. 继续压迫24h B. 继续压迫至大便潜血转阴后放气拔管
C. 气囊放气, 留置三腔管观察24h D. 放气拔管, 继续内科治疗
E. 放气拔管转外科手术治疗

(59-60题共用题干)

患者男性, 49岁。特殊职业, 在生产有机磷农药工作中违反操作规定, 出现有机磷中毒症状, 头晕、头痛、乏力、支气管分泌物增多、呼吸困难, 逐渐出现烦躁不安、谵妄、抽搐及昏迷。

59. 有机磷农药中毒诊断的主要指标是 ()

- A. 典型症状 B. 呕吐物 C. 瞳孔缩小 D. 意识障碍 E. 全血胆碱酯酶测定

60. 有机磷农药中毒最常用抗胆碱药阿托品, 其作用是 ()

- A. 缓解肌肉震颤 B. 缓解肌肉抽搐 C. 促使昏迷患者苏醒
D. 使瞳孔缩小 E. 抑制腺体分泌

61. 患者, 女性, 56岁, 因上消化道出血入院, 护士在病情观察的过程中, 发现患者出现了再次出血, 下列不符的一项是 ()

- A. 肠鸣音亢进 B. 黑便次数增加 C. 尿素氮持续升高
D. 网织红细胞计数减少 E. 呕吐物由咖啡色转为暗红色

62. 慢性肾小球肾炎必有的临床表现是 ()

- A. 贫血 B. 血尿 C. 水肿 D. 高血压 E. 蛋白尿

63. 营养性缺铁性贫血铁剂治疗有效的早期标志是 ()

- A. 血红蛋白增加 B. 网织红细胞增加 C. 血清总铁结合力增加
D. 白细胞总数增加 E. 红细胞总数增加

64. 风心病二尖瓣狭窄最常出现的早期症状是 ()

- A. 劳力性呼吸困难 B. 夜间阵发性困难 C. 咳血 D. 心悸 E. 脑血栓

65. 患者, 男, 76岁, 患慢性肺心病, 近几天神志恍惚, 白天嗜睡, 晚间兴奋, 今晨出现谵妄, 肌肉抽搐, 昏迷, 抢救无效死亡, 死亡的主要原因是 ()

- A. 呼吸衰竭 B. 心力衰竭 C. 肺性脑病 D. 呼吸性酸中毒 E. 上消化道出血

66. 出现夜间阵发性呼吸困难提示 ()

- A. 左心衰 B. 支气管炎 C. 大叶性肺炎 D. 支气管哮喘 E. 胸腔积液
67. 慢性肺源性心脏病最常见的病因是（ ）
 A. 支气管哮喘 B. 重症肺结核 C. 支气管扩张
 D. 慢性阻塞性肺气肿 E. 特发性肺间质纤维化
68. 肾盂肾炎的易感因素不包括（ ）
 A. 尿路感染 B. 机体抵抗力降低 C. 女性 D. 膀胱炎 E. 口腔感染
- (69-70题共用题干)
 患者男性，43岁，间歇性上腹痛3年，有嗳气、反酸、食欲不振，冬春季节较常发作。近3天来腹痛加剧，且突然呕血400ml。
69. 该患者出血的原因，最有可能的是（ ）
 A. 慢性胃炎 B. 消化性溃疡 C. 胃癌 D. 胃肠道黏膜糜烂 E. 肝硬化
70. 为确诊原因，应首选（ ）
 A. X线钡餐检查 B. 超声检查 C. 大便隐血试验 D. 纤维内镜检查 E. 胃液分析
71. 在成年患者中，白血病类型最多见的是（ ）
 A. 慢性粒细胞白血病 B. 慢性淋巴细胞白血病 C. 幼淋巴细胞白血病
 D. 急性粒细胞白血病 E. 急性淋巴细胞白血病
72. 脑出血最常见的部位是（ ）
 A. 脑桥 B. 脑干 C. 小脑 D. 内囊 E. 大脑半球
73. 再生障碍性贫血的发生机制为（ ）
 A. 造血原料缺乏 B. 骨髓造血功能低下 C. 急性失血
 D. 严重感染 E. 红细胞破坏
74. 左心衰竭的呼吸困难在出现右心衰竭时减轻的原因是（ ）
 A. 右室扩张 B. 肺动脉压下降 C. 静脉压升高 D. 右心排血量下降
 E. 左心排血量增加
75. 引起肝硬化最常见的原因是（ ）
 A. 胆道疾病 B. 病毒性肝炎 C. 幽门螺杆菌感染 D. 血吸虫病 E. 上消化道出血
76. 一位25岁女性，患风湿性心脏病4年后发生房颤，住院时突然出现偏瘫、头痛，首先考虑其发生了（ ）
 A. 心力衰竭 B. 脑栓塞 C. 脑血栓形成 D. 洋地黄中毒 E. 感染性心内膜炎
77. 糖尿病基本病理生理改变是（ ）
 A. 胰岛素绝对或相对不足 B. 胰高血糖素分泌减少 C. 糖皮质激素分泌过多
 D. 生长激素分泌过多 E. 甲状腺激素分泌过多
78. 下列哪种心律失常应视为危急情况（ ）
 A. 心房颤动 B. 窦性心动过速 C. 室性早搏，“R”落在“T”上。
 D. 室性早搏，2-3次/min E. 窦性心律不齐
79. 患者，男性，28岁，8小时前暴饮暴食后出现上腹部绞痛，向肩背部放射，送到医院急诊，此时最具诊断意义的实验室检查为（ ）
 A. 血清淀粉酶测定 B. 尿淀粉酶测定 C. 血钙测定
 D. 血清脂肪酶测定 E. 血糖测定
80. 慢性支气管炎最常见的并发症（ ）
 A. 急性肺部感染 B. 呼吸衰竭 C. 阻塞性肺气肿 D. 自发性气胸 E. 肺源性心脏病
81. 下列哪项不是法洛四联症的畸形组成（ ）

- A. 室间隔缺损 B. 房间隔缺损 C. 主动脉骑跨 D. 左心室肥厚 E. 肺动脉狭窄
82. 病人头面部大出血时，急救止血应压迫的动脉是（ ）
 A. 面动脉 B. 颈总动脉 C. 颈内动脉 D. 颈外动脉 E. 颈内静脉
83. 某女士，27岁，在甲状腺次全切除术后4小时，突感呼吸困难，颈部肿胀，口唇紫绀，紧急处理第一步应（ ）
 A. 吸氧 B. 气管切开 C. 注射呼吸兴奋剂
 D. 请麻醉医师插管 E. 立即拆开颈部缝线，去除血块
84. 周先生，40岁，体重60kg。反复呕吐一周，测得血钠125mmol/L，血钾3mmol/L。初步考虑为（ ）
 A. 低钾血症，高渗性脱水 B. 高钾血症，重度缺钠 C. 低钾血症，轻度缺钠
 D. 低钾血症，中度缺钠 E. 血钾正常，等渗性脱水
85. 患者男性，50岁。胃溃疡急性穿孔修补术后，伤口愈合良好，无红肿、化脓，其伤口愈合记录是（ ）
 A. I甲 B. II丙 C. II甲 D. III甲 E. II乙
86. 小脑幕切迹疝和枕骨大孔疝的主要鉴别点是（ ）
 A. 意识障碍逐渐加深 B. 一侧瞳孔散大 C. 去大脑强直发作
 D. 病变对侧肢体瘫痪 E. 生命体征改变
87. 下列叙述哪项是错误的（ ）
 A. 感染后组织与器官发生坏死液化形成脓液聚积称脓肿
 B. 疖是单个毛囊及所属皮脂腺的感染
 C. 多个不相关联的疖形成痈
 D. 丹毒是皮内网状淋巴管及皮肤的急性炎症
 E. 皮下疏松结缔组织的弥漫性炎症称蜂窝织炎
88. 决定是否可做大隐静脉剥脱术或结扎术的检查是（ ）
 A. 浅静脉瓣膜功能试验 B. 深静脉瓣膜功能试验 C. 交通支瓣膜功能试验
 D. 深静脉通畅试验 E. 浅静脉通畅试验
- (89-90题共用题干)
 患者，女性，35岁。体重60kg，头、面、颈部及双上肢II度烧伤，前胸约有3个手掌III度烧伤。
89. 该患者的烧伤面积为（ ）
 A. 18% B. 21% C. 30% D. 40% E. 48%
90. 伤后第一个24小时补液量为（ ）
 A. 3000ml B. 3500mL C. 4000ml D. 4700ml E. 5000ml
91. 患者男性35岁。长期吸烟，右下肢反复发作静脉炎，并有间歇性跛行，最可能的诊断是（ ）
 A. 雷诺病 B. 动脉栓塞 C. 大动脉炎 D. 血栓闭塞性脉管炎 E. 动脉硬化性闭塞症
92. 诊断腹腔内实质性脏器损伤的最主要依据是（ ）
 A. 外伤后腹痛 B. 腹膜刺激征 C. 移动性浊音阳性
 D. 肠鸣音减弱 E. 腹腔穿刺有不凝固血液
93. 慢性肺源性心脏病病人，喘憋明显，略有烦躁治疗中应用镇静剂，是为了避免（ ）
 A. 洋地黄中毒 B. 双重感染 C. 脱水，低血钾
 D. 诱发肺性脑病 E. 加重心功能衰竭

94. 男性，18岁，饭后剧烈运动后突然出现剧烈腹痛，向腰背部放射，呕吐，应考虑为（ ）
 A. 小肠扭转 B. 肠套叠 C. 肠粘连 D. 肠肿瘤 E. 肠系膜动脉栓塞
95. Charcot三联征发生的顺序是（ ）
 A. 黄疸、寒战高热、腹痛 B. 腹痛、寒战高热、黄疸 C. 寒战高热、黄疸、腹痛
 D. 黄疸、腹痛、寒战高热 E. 腹痛、黄疸、寒战高热
96. 开放性气胸产生纵隔扑动的主要原因是（ ）
 A. 伤侧肺萎缩 B. 健侧肺膨胀不全 C. 纵隔移向健侧
 D. 吸气与呼气时两侧胸腔内压力差改变 E. 伤侧胸膜腔内压力超过大气压
97. 粘连性肠梗阻最常见的原因是（ ）
 A. 先天性肠管发育异常 B. 胎粪性腹膜炎 C. 腹腔手术后
 D. 腹部损伤 E. 腹腔内肿瘤
98. 一患者行胃大部切除术后发生了倾倒综合征，以下哪项处理是错误的（ ）
 A. 少食多餐 B. 低脂肪饮食 C. 控制甜食 D. 餐后平卧10~20分钟 E. 软质饮食
99. 下列哪项不是休克抑制期的临床表现（ ）
 A. 精神兴奋 B. 血压下降 C. 脉搏细速 D. 尿量减少 E. 精神萎靡
100. 患者女，23岁。患甲状腺功能亢进症，在进行¹³¹I治疗过程中发生恶心，呕吐，大汗淋漓，神志恍惚。查体：T 39℃，心率160次/分，提示患者发生了（ ）
 A. ¹³¹I治疗正常反应 B. 甲状腺危象 C. 淡漠型甲亢
 D. 甲状腺功能低下 E. 过敏反应
101. 胃癌最主要的转移途径是（ ）
 A. 直接蔓延 B. 淋巴转移 C. 血行转移 D. 消化道转移 E. 腹腔种植
102. 莫菲氏征阳性见于（ ）
 A. 急性阑尾炎 B. 急性胆管炎 C. 急性胆囊炎
 D. 急性胰腺炎 E. 胃十二指肠溃疡急性穿孔
103. 患者男性，35岁。胃穿孔腹膜炎手术后第5天检查体温38.8℃，切口无红肿，大便次数增多，有粘液，伴里急后重，应考虑并发（ ）
 A. 膈下脓肿 B. 切口感染 C. 盆腔脓肿 D. 肠间脓肿 E. 肺部感染
104. 病原菌在局部生长繁殖而不入血，只有其产生的毒素入血，到达易感组织和细胞，引起独特的临床中毒症状称为（ ）
 A. 菌血症 B. 败血症 C. 毒血症 D. 脓毒血症 E. 中毒性休克
- (105-106题共用题干)
 患者男性，65岁。有慢性便秘多年。近半年来发现，站立时阴囊部位出现肿块，呈梨形；平卧时可还纳。体检发现外环扩大，嘱病人咳嗽指尖有冲击感，平卧回纳肿块后，手指压迫内环处，站立咳嗽，肿块不再出现，拟诊腹外疝，准备手术治疗。
105. 此病人诊断为（ ）
 A. 腹股沟斜疝 B. 腹股沟直疝 C. 股疝 D. 脐疝 E. 切口疝
106. 术后预防阴囊血肿的措施是（ ）
 A. 仰卧位 B. 保持敷料清洁、干燥 C. 托起阴囊、伤口砂袋压迫
 D. 应用抗生素 E. 不可过早下床活动
107. 颅中窝骨折脑脊液耳漏时，禁忌外耳道堵塞和冲洗的目的是（ ）
 A. 预防颅内血肿 B. 降低颅内压力 C. 避免脑疝形成

- D. 减少脑脊液外漏 E. 预防颅内感染
108. 患者，男性，50岁，无吸烟史和肺部疾病史，全麻下行肠道手术。术后麻醉未清醒，呼吸时出现鼾声，此时应先采取的措施是（ ）
A. 观察病情 B. 气管插管 C. 环甲膜穿刺 D. 托起病人下颌 E. 吸痰、注射阿托品
109. 对严重挤压伤的患者，护理时应特别注意观察（ ）
A. 尿量和尿色 B. 伤口肿胀程度 C. 肢端的温度 D. 精神状态 E. 局部疼痛情况
110. 中心静脉压(CVP)的正常值为（ ）
A. 5~12cmH₂O B. 15~20cmH₂O C. 2~5cmH₂O D. 2~5mmHg E. 5~10mmHg
111. 急性腹膜炎腹痛的特点是（ ）
A. 阵发性绞痛 B. 持续性疼痛阵发性加剧 C. 腹痛向肩胛部放射
D. 持续性疼痛，多较剧烈 E. 钻顶样绞痛
112. 下列急性腹膜炎的临床表现最有诊断价值的是（ ）
A. 持续性腹痛 B. 肠鸣音减弱 C. 移动性浊音 D. 腹膜刺激征 E. 腹胀、呕吐
113. 颅脑损伤患者意识改变出现中间清醒期时，应注意发生（ ）
A. 硬脑膜外血肿 B. 硬脑膜下水肿 C. 脑内血肿 D. 脑损伤 E. 脑震荡
114. Colles骨折表现为（ ）
A. 枪刺刀畸形 B. 杜加试验阳性 C. 易发生骨折不愈合
D. 肘后三点关系失常 E. 易合并正中神经损伤
115. 外科急腹症患者，在未明确诊断时应严格执行“四禁”。下列哪项不属于“四禁”内容（ ）
A. 禁用吗啡类药止痛 B. 禁饮食 C. 禁服泻药 D. 禁灌肠 E. 禁腹部透视
116. 甲状腺术后呼吸困难和窒息多发生于术后的时间（ ）
A. 24小时内 B. 36小时内 C. 48小时内 D. 72小时内 E. 12小时内
117. 患者女25岁，每逢月经来潮前数天自觉两侧乳房胀痛，又能触及边界不清的多数小结节状肿物。月经期过后疼痛减轻，首先考虑的是（ ）
A. 乳房纤维腺瘤 B. 乳房囊腺增生病 C. 乳管内乳头状瘤
D. 乳房慢性炎症 E. 乳癌
118. 肾肿瘤最常见的早期症状是（ ）
A. 疼痛 B. 低热 C. 腰部肿块 D. 间歇性无痛性全程血尿 E. 贫血
- (119~120题共用题干)
患者女性，50岁。无意中发现左乳房无痛性肿块，体检见左侧乳房外上象限触及直径3cm肿块，质硬，表面光滑边界清楚，活动度小，局部皮肤凹陷，区域淋巴结不肿大，拟行根治性手术。
119. 乳房癌淋巴转移的最常见部位是（ ）
A. 腋窝 B. 纵膈 C. 锁骨下 D. 锁骨上 E. 胸骨旁
120. 出现皮肤凹陷提示癌肿侵犯（ ）
A. 大乳管 B. 胸筋膜 C. Cooper韧带 D. 胸大肌 E. 皮内淋巴管

二、多项选择题（每题2分，共60分）

1. 对于护理概念的表述下列哪些是正确的（ ）
A. 护理的研究对象是整体的人，即处于不同健康状态的人
B. 护理能增强人的应对及适应能力，满足人的各种需要
C. 护理是诊断和处理人类对健康问题的反应

- D. 护理的科学工作方法即护理程序
E. 护理的对象包括人、群体、社区
2. 下列哪些是临终关怀理念（ ）
A. 以对症为主的照料 B. 提高患者的生命质量 C. 尊重患者的尊严和权利
D. 注重家属的心理支持 E. 延长病人的生存时间
3. 下列属长期医嘱的是（ ）
A. 病危 B. 一级护理 C. 氧气吸入 prn D. 大便常规 E. 半流质
4. 影响健康的因素有（ ）
A. 生物因素 B. 环境因素 C. 心理因素 D. 生活方式 E. 社会因素
5. 护理诊断的特点是（ ）
A. 临床判断 B. 在患病期间诊断始终不变
C. 由护理人员和医疗人员共同制定 D. 问题的范畴应在护理职责范围内
E. 描述由 P、E、S 三个部分组成
6. 氧疗的副作用有（ ）
A. 氧中毒 B. 肺不张 C. 呼吸道分泌物干燥
D. 呼吸抑制 E. 晶状体后纤维组织增生
7. 关于影响血压的因素正确的说法是（ ）
A. 心脏每搏输出量的多少影响收缩压 B. 心率主要影响舒张压
C. 外周阻力影响舒张压 D. 外周阻力影响收缩压
E. 主动脉和大动脉弹性影响脉压
8. Glasgow 昏迷评分法通过哪几方面来评定病人的意识状况（ ）
A. 睁眼 B. 语言 C. 运动 D. 瞳孔大小 E. 对光反射
9. 以下哪些人群是发生压疮的高危人群（ ）
A. 水肿病人 B. 身体瘦弱、营养不良者 C. 大小便失禁者 D. 烦躁病人 E. 咳嗽病人
10. 王女士，在输液过程中突然出现呼吸困难，气促，咳嗽，咳粉红色泡沫痰，听诊两肺湿啰音，心率快且节律不齐。对该病人的护理措施正确的是（ ）
A. 立即停止输液并通知医生紧急处理
B. 高流量氧气吸入
C. 氧气湿化瓶内加入 50% 乙醇湿化氧气
D. 遵医嘱给予镇静剂，平喘、强心、利尿和扩血管药物
E. 病情允许可使病人端坐，双下肢下垂，必要时四肢轮扎
11. 肝门静脉系与上、下腔静脉的吻合主要有（ ）
A. 食管静脉丛 B. 脐周静脉网 C. 翼静脉丛 D. 膀胱静脉丛 E. 直肠静脉丛
12. 诊断糖尿病的诊断依据是哪些（ ）
A. 空腹血浆葡萄糖 $\geq 7.0 \text{ mmol/L}$
B. 糖尿病症状 + 随机血浆葡萄糖 $\geq 11.1 \text{ mmol/L}$
C. $6.1 \text{ mmol/L} < \text{空腹血浆葡萄糖} < 7.0 \text{ mmol/L}$
D. 空腹血浆葡萄糖 $< 6.1 \text{ mmol/L}$
E. 葡萄糖负荷后两小时血糖 (2hPG) $\geq 11.1 \text{ mmol/L}$
13. 下列胃镜检查术前及术后注意事项正确的是（ ）
A. 术前做好解释工作，争取病人配合
B. 检查前禁食、禁饮至少 6 小时

- C. 检查结束后嘱病人静卧休息，12小时后方可进食
 D. 做活检及细胞刷取样者，术后当日进流质，次日进软食
 E. 术后病人咽喉部不适者，可口含润喉片或漱口液含漱
14. 洗胃的禁忌症有（ ）
 A. 硫酸中毒 B. 近期上消化道出血 C. 生物碱中毒
 D. 肝硬化伴食管静脉曲张 E. 胃癌
15. 糖尿病酮症酸中毒时，护士需快速建立两条静脉通道，其用途为（ ）
 A. 快速输入胰岛素，迅速降低血浆葡萄糖 B. 大量补液
 C. 抗感染 D. 纠正电解质及酸碱失衡 E. 每小时4~6“小剂量输入胰岛素
16. 女性病人，44岁。平时经常怕热、多汗、心悸、失眠、心动过速，偶有期前收缩，除拟诊为甲状腺功能亢进症外，还应与下列哪些疾病相鉴别（ ）
 A. 风湿热 B. 结核病 C. 冠心病 D. 神经官能症 E. 单纯性甲状腺肿
17. 女性病人，25岁，营业员，新婚后发现全身暴露部位有对称性皮疹，关节肌肉酸痛，常有低热，经医院检查发现有蛋白尿、血尿、管型尿，怀疑系统性红斑狼疮收入院，可做哪些实验室检查以明确诊断（ ）
 A. 红细胞沉降率 B. 抗核抗体 C. 抗Sm抗体
 D. 抗双链DNA抗体 E. 血或骨髓查找狼疮细胞
18. 脑出血病人出现下列哪些情况提示有脑疝的可能（ ）
 A. 意识障碍加重 B. 呕吐频繁 C. 血压升高 D. 心率变慢 E. 烦躁不安
19. 急性白血病的主要临床特征是（ ）
 A. 组织器官浸润 B. 不同程度发热 C. 早期即可出血
 D. 进行性贫血 E. 功能性呕吐
20. 各型DIC临床表现的共同点为下列哪些（ ）
 A. 出血 B. 溶血 C. 休克 D. 栓塞 E. 呼吸衰竭
21. 胸腔闭式引流期间为预防气体进入胸腔，正确的措施有（ ）
 A. 病人搬动时，用两把血管钳将引流管夹紧
 B. 更换引流瓶时，将近心端的引流管夹住后再更换
 C. 引流瓶中长管的一端置于水面下3~4cm
 D. 引流瓶被打破时，应立即夹住引流管
 E. 引流管不慎滑出时，应立即用纱布覆盖伤口
22. 结肠手术前肠道准备的意义是（ ）
 A. 减少术中出血 B. 减少术中污染 C. 防止术后腹胀
 D. 防止切口感染 E. 有利于吻合口愈合
23. 亚低温治疗的并发症有（ ）
 A. 肺部感染 B. 心律失常 C. 低血容量性休克
 D. 泌尿系感染或结石 E. 压疮或冻伤
24. 肾损伤非手术治疗病人的护理措施有（ ）
 A. 绝对卧床休息2~4周 B. 2~3个月内不宜参加体力劳动或竞技运动
 C. 腰腹部疼痛者，给予精神上的安慰，避免使用止痛剂，以免掩盖病情
 D. 避免躁动而加重出血 E. 动态观察血压、脉搏
25. 术后发生血栓性静脉炎的主要原因有（ ）
 A. 病人卧床过久，活动减少 B. 血液凝固性增加

- C. 反复输注刺激性较强的药物 D. 全身营养状况差
E. 血管反复穿刺置管
26. 肠外营养与静脉穿刺置管有关的主要并发症有（ ）
A. 气胸 B. 血栓性静脉炎 C. 血管损伤
D. 非酮性高渗性高血糖性昏迷 E. 导管移位
27. 下列关于急性化脓性腹膜炎描述，正确的是（ ）
A. 原发病不同，腹痛性质不同 B. 早期常有恶心、呕吐
C. 体温开始可正常 D. 肠鸣音持续亢进
E. 直肠前窝饱满伴触痛
28. 应给予多饮水的泌尿系统常见疾病包括（ ）
A. 尿路感染 B. 放置各种造口引流管者
C. 膀胱镜检查后 D. 尿路结石 E. 静脉肾盂造影前
29. 反常呼吸的定义包括（ ）
A. 相邻多根多处肋骨骨折 B. 吸气时，软化区的胸壁内陷
C. 吸气时，软化区的胸壁向外鼓出 D. 呼气时，软化区向外鼓出
E. 呼气时，软化区内陷
30. 骨科长期卧床病人常发生的肢体畸形有（ ）
A. 肩内收畸形 B. 髋关节外展畸形 C. 髋关节屈曲畸形
D. 足下垂畸形 E. 膝关节外展畸形

三、案例分析题（每题 20 分，共 60 分）

(一) 刘女士，56岁，因“上腹部手术后，切口及肺部感染伴败血症”收入外科ICU监护。体格检查：体温波动在37.5~39.5℃之间，伴寒战，脉搏116次/分钟，呼吸急促，呼吸频率37次/分钟，血压144/100mmHg，血气分析检查结果显示PaO₂为53mmHg。立即行气管插管并接呼吸机辅助呼吸，合并采用同步间歇指令性通气(SIMV)+压力支持通气(PSV)+呼气末正压(PEEP)5cmH₂O模式，呼吸频率开始下降，低于30次/分。目前患者病情趋于稳定，维持呼吸机辅助通气。请问：

1. 该患者入院时的护理诊断有哪些？(3分)
2. 患者在接受呼吸机治疗的过程中，在需要吸痰时，应如何选择合适的吸痰管？吸痰压力范围应如何设置？(5分)
3. 如何进行高热的护理？(7分)
4. 用需要理论解释该患者有哪些需要？(5分)

(二) 黄某，女，42岁，营业员，已婚，育有一子，长期采用药物避孕，因胆囊炎胆石症于3天前在全麻下行胆囊切除术，手术顺利，术后进行胃肠减压、T管引流。今天病人肠蠕动恢复，医嘱停胃肠减压，拔除胃管，清流质饮食，继续输液和静脉使用抗生素，输液结束后下地活动。病人要求去卫生间排便，护士给予协助，排便后返回病房，20分钟后病人呼叫床头铃，护士立即前来发现病人烦躁不安，表情惊恐、主诉气短、胸痛。身体评估：体温37.9℃，脉搏124次/分，律齐，呼吸36次/分，血压130/80mmHg，神志清楚，呼吸费力，左下肺闻及细湿罗音。右下肢肿胀，呈暗红色，有压痛。请问：

1. 该患者发生了什么并发症？(3分)你做出此判断的依据是什么？(3分)
2. 哪些检查有助于确诊？(4分)

3. 请列出该患者的首优护理诊断？（4分）采取哪些护理措施？（6分）

(三) 张先生，58岁，因突发胸骨后剧烈疼痛伴大汗，四肢冰冷3h后来院急诊。体格检查：体温36.4℃，脉搏58次/分，呼吸19次/分，血压80/60mmHg，神志清楚，急性病容，被动卧位，口唇发绀。请问：

1. 该患者可能的医疗诊断是什么？（2分）
2. 其治疗原则是什么？（4分）
3. 列出该患者的护理诊断？（5分）并为其中一个护理诊断制定护理计划。（4分）
4. 作为护士如何做好休息与活动的指导？（5分）